

## Рецепты к экзамену по дисциплине «Фармакология»

### Специальность Лечебное дело

1. Выпишите рецепт: раствор кальция хлорида для инъекций.  
Назначить: внутривенно (медленно, в течение 3- 5 мин) — 5 мл.
2. Выпишите рецепт: мазь тетрациклиновая 1% глазная.  
Назначить - закладывать за нижнее веко 3-5 раз в день.
3. Выпишите рецепт: раствор эуфиллина для внутривенных инъекций.  
Назначить: внутривенно (медленно в течение 4–6 мин), 10 мл 2,4% раствора (предварительно развести в 10–20 мл 20% или 40% раствора глюкозы);
4. Выпишите рецепт: Мелоксикам - раствор 10 мг/мл для инъекций, 5 ампул по 1.5 мл. Назначить: внутримышечно 1 мл. однократно.
5. Выпишите рецепт: Кеторолак - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, в ампулах по 1 мл. Назначить : по 1 мл. внутримышечно 2 раза в день. Длительность лечения -2 суток.
6. Выпишите рецепт: раствор Новокаина для разведения Бензилпенициллина натриевой соли.
7. Выпишите рецепт:  
Возьми: Настоя корневищ с корнями Алтея 150 мл  
Натрия гидрокарбоната 2,0  
Настойки мяты 2 мл  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
8. Выпишите рецепт: таблетки Каптоприл .  
Назначить: внутрь за 1 ч до еды по 1 таблетке ( 25 мг) 2 раза в сутки.
9. Выпишите рецепт: таблетки Метопролол.  
Назначить : по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в день (утром и вечером) одновременно с приемом пищи или сразу после еды.
10. Выпишите рецепт: таблетки Новокаионамид.  
Назначить: 2 таблетки ,затем по 1 таблетке (250 мг.) каждые 6 ч независимо от приема пищи.
11. Выпишите рецепт: Метоклопрамид - раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл в ампулах по 2 мл.  
Назначить : для внутримышечного введения по 2 мл 2 раза в день
12. Выпишите рецепт: таблетки Кларитромицина. Назначить: по 1 таблетке (250 мг.) 2 раза в сутки. Длительность лечения 7 дней.
13. Выпишите рецепт: Бензилпенициллин во флаконах по 1000 000 ЕД. Назначить внутримышечно по 600 0000 4 раза в день, 5 дней.
14. Выпишите раствор сульфата магния для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл, №10 в ампулах по 10 мл.  
Назначить : при судорожном синдроме в/м по 5 мл раствора.
15. Выпишите рецепт: Драже «Арифон» по 2.5 мг №30 .  
Назначить: внутрь утром по 1 драже в сутки.
16. Выпишите рецепт: раствор Новокаина для блокады.
17. Выпишите рецепт: раствор фурацилина для промывания мочевого пузыря.

18. Выпишите рецепт:

Возьми: Настоя корневищ с корнями Валерианы 150 мл

Кофеина – бензоата натрия 0,4

Натрия бромида 1,0

Магния сульфата 2,0

Настойки мяты 2 мл

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день

19. Выпишите рецепт: таблетки Дротаверина.

Назначить по 1 таблетке 2 раза в день

20. Выпишите рецепт: суппозитории ректальные с папаверином 20 мг, №10.

Назначить: ректально - по 1 суппозиторию 3 раза в сутки.

21. Выпишите рецепт: Нимесулид- гранулы для приготовления суспензии для приема

внутри. Назначить : По 1 пакетику (100 мг нимесулида) 2 раза в день после еды.

Содержимое пакетика высыпают в стакан и растворяют примерно в 100 мл воды.

Приготовленный раствор хранению не подлежит.

22. Выпишите рецепт: Трансдермальная система с Фентанилом 25 мкг/ч. Местно, на

72 ч накладывать на поверхность кожи предплечья.

23. Выпишите рецепт: Каптоприл таблетки 25 мг, №40 . Принимать внутри 2 раза в

сутки за час до еды.

24. Выпишите рецепт: Раствор Атропина сульфата для инъекций. Для купирования

острых болей при язве желудка и 12-перстной кишки - в/м по 1 мл раствора.

25. Выпишите рецепт: Омепразол в капсулах .

Назначить : внутри утром перед едой или во время приема пищи, запивая

небольшим количеством воды (содержимое капсулы нельзя разжевывать), по 1

капсуле (20 мг) 1 раз в сутки.

26. Выпишите рецепт:

27. Возьми: Фенобарбитала 10 мг

Сахара 200 мг

Смешай, чтобы получился порошок.

Дай таких доз № 60

Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день до еды.

28. Выпишите рецепт: Раствор Кальция глюконата для внутривенного введения,

медленно (2–3 мин). Ампулы с раствором перед введением подогревают до

температуры тела. Взрослым — по 10 мл 1 раз в день, 10 дней.

29. Выпишите рецепт: Супрастин -раствор для внутривенного и внутримышечного

введения 20 мг/мл, №10 –в ампулах по 1 мл .

Назначить : внутримышечно по 1 мл 1 раз в день

30. Выпишите рецепт:

Возьми: Тальк, крахмал, ксероформ поровну по 5,0 .

Смешай, чтобы получился порошок.

Обозначь: присыпка.

31. Выпишите рецепт: Настойки полыни во флаконе 25 мл.

Назначить по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды.

32. Выпишите рецепт: таблетки «Йодомарин 100»

Назначить по 1 таблетке в день.

33. Выпишите рецепт: Димедрол – таблетки .  
Назначить: Внутрь - по 1 таблетке (50 мг ) 1раз в день на ночь. Курс — 10–15 дней.
34. Выпишите рецепт: Амоксициллин- таблетки диспергируемые , №10.  
Назначить : по 1 таблетке (500 мг) после приема пищи 2 раза в сутки 7 дней.  
Таблетку можно проглотить целиком или развести в воде с образованием сиропа (в 20 мл) или суспензии (в 100 мл).
35. Выпишите рецепт: капсулы Амоксициллин №10.  
Назначить : по 1 капсуле (500 мг) после приема пищи 3 раза в сутки 5 дней.
36. Выпишите рецепт:  
Возьми: Настоя корней Алтея 150 мл.  
Натрия гидрокарбоната 1.5  
Нашатырно-анисовых капель 3 мл.  
Смешай, выдай.  
Обозначь: по 1 десертной ложке 3 раза в день.